

R R

H

d

重要用药说明

-
-
-
-

针对类风湿关节炎、银屑病关节炎和强直性脊柱炎的推荐剂量

1

1

1

<ul style="list-style-type: none">●● <p><i>见药物相互作用</i></p>	
<ul style="list-style-type: none">●●	

-
-
-
-
-
-
-
-

临床试验经验

实验室检查异常

-
-
-

2

DMARD 0-3

*

	5mg	10mg **	
	N=1336	N=1349	N=809
	%	%	%

(见用法用量)

上市后经验

严重感染

结核病

病毒再激活

死亡

非黑色素瘤皮膚癌

重大心血管不良事件

血栓形成

胃肠道穿孔

超敏反应

实验室检查异常

淋巴细胞异常

中性粒细胞减少症

贫血

肝酶升高

血脂升高

疫苗接种

糖尿病患者用药

肾功能损害

肝功能损害

见药代动力学

疾病相关母体和/或胚胎/胎儿风险

3

CYP3A4	
CYP3A4	CYP2C19
CYP3A4	

吸收


分布

代谢和排泄

患者人群中药代动力学特点


4	5 mg a (CV%)	5 mg
---	--------------------	------

1



托法替布影响其他药物药代的可能性

2



其他药物影响托法替布药代动力学的可能性

3

